



Informação
De Segurança
Importante
Sobre PRILIGY®

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers between accounts.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the accounting cycle. It outlines the ten steps involved in the process, from identifying the accounting entity to preparing financial statements. Each step is explained in detail, with examples provided to illustrate the concepts.

The third part of the document focuses on the classification of accounts. It discusses the different types of accounts, such as assets, liabilities, equity, revenue, and expense accounts, and how they are used to record and summarize business transactions.

The fourth part of the document covers the process of journalizing and posting. It explains how transactions are recorded in the journal and then posted to the ledger accounts. This process is essential for maintaining the double-entry system and ensuring that the books are balanced.

The fifth part of the document discusses the preparation of financial statements. It outlines the steps involved in calculating the net income, preparing the income statement, balance sheet, and statement of cash flows. It also discusses the importance of comparing the results of the current period with those of the previous period.

The sixth part of the document covers the closing process. It explains how the temporary accounts (revenue, expense, and dividend accounts) are closed to the permanent accounts (assets, liabilities, and equity accounts) at the end of the accounting period. This process is necessary to reset the temporary accounts for the next period.

The seventh part of the document discusses the importance of internal controls. It outlines the various measures that can be taken to prevent and detect errors and fraud, such as segregation of duties, authorization, and independent checks.

The eighth part of the document covers the use of accounting software. It discusses the benefits of using computerized accounting systems, such as increased accuracy, efficiency, and ease of use. It also provides an overview of the different types of accounting software available.

The ninth part of the document discusses the role of the accountant. It outlines the various responsibilities of an accountant, such as recording transactions, preparing financial statements, and providing financial advice to management. It also discusses the different types of accountants and the skills and qualifications required for the profession.

The tenth part of the document covers the future of accounting. It discusses the impact of new technologies, such as artificial intelligence and blockchain, on the accounting profession. It also discusses the importance of continuing education and staying up-to-date on the latest developments in the field.

A Ejaculação Precoce e PRILIGY®

PRILIGY® é um medicamento oral aprovado para o tratamento da Ejaculação Precoce (EP) em homens com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos.¹

A eficácia de PRILIGY® no tratamento da ejaculação precoce foi estabelecida em cinco ensaios clínicos em dupla ocultação e controlados com placebo, nos quais foram aleatorizados um total de 6081 indivíduos.¹

Apesar dos dados de eficácia demonstrados, PRILIGY®, como todos os medicamentos, pode causar efeitos secundários.

Porque todas as questões de segurança merecem a nossa melhor atenção, gostaríamos de alertá-lo para as seguintes recomendações relacionadas com a utilização adequada de PRILIGY®.

Recomendações Para Tratamento Com PRILIGY®:

| | | |
|---|---|---|
| <p>Antes do tratamento</p> | <p>Obtenha a história clínica do doente focando-se em acontecimentos ortostáticos passados e realize um teste ortostático (medição da tensão arterial e pulso, em supinação e em pé).¹</p> | |
| | <p>Evite o tratamento com PRILIGY® se existirem sinais de hipotensão ortostática.</p> | |
| <p>Início do tratamento</p> | <p>Inicie o tratamento com PRILIGY® 30 mg (quando necessário) e informe o doente sobre o que esperar do medicamento.¹ Forneça ao doente toda a informação importante de segurança. Instrua o doente sobre como evitar a síncope (reação adversa pouco frequente) e sobre a importância de manter-se hidratado.</p> | |
| <p>Seguimento do doente após as primeiras 4 semanas ou 6 doses de tratamento¹</p> | <p>Avalie os riscos e os benefícios mencionados pelo doente por forma a avaliar a relação benefício-risco do tratamento e determine se será apropriado continuar o tratamento.¹ Lembre-se de notificar qualquer reação adversa como, por exemplo, casos de síncope (reação adversa pouco frequente).</p> <p>Contactos para notificação de reações adversas: Unidade de Farmacovigilância - Janssen Cilag Farmacêutica, Lda e-mail: farmacovigilancia@jnpt.jnj.com Tel.: 21 436 88 35 Fax.: 21434 30 28</p> <p>e/ou</p> <p>INFARMED e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt Tel.: 21 798 71 40 Fax.: 21 798 71 55</p> | |
| <p>Tratamento continuado</p> | <p>Se a dose de 30 mg foi suficiente e o perfil de efeitos secundários aceitável, o doente deverá manter a dose de 30 mg.¹</p> | <p>Se a dose de 30 mg não foi suficiente e os efeitos secundários forem aceitáveis, a dose poderá ser aumentada até à dose máxima recomendada de 60 mg.¹</p> <p>Se o doente tiver sofrido hipotensão ortostática com a dose inicialmente prescrita, não deverá ser efectuado o aumento de dose para 60 mg.¹</p> |

- A dose inicial recomendada para todos os doentes é de 30 mg, tomada conforme necessário, aproximadamente 1 a 3 horas antes da actividade sexual.
- A frequência de tomas máxima recomendada é de uma vez em cada 24 horas.
- Os comprimidos deverão ser tomados com pelo menos um copo cheio de água.

Os doentes devem ser cautelosos enquanto se encontram em tratamento com PRILIGY®, uma vez que este pode causar desmaios (pouco frequente):¹

- Os doentes devem ser instruídos, para no caso de sentirem que podem desmaiar (ex., sentirem tonturas ou sensação de desfalecimento), se deitarem de imediato de modo a que a cabeça fique numa posição inferior à do resto do corpo ou se sentarem com a cabeça entre os joelhos até que se sintam melhor. Isto prevenirá que caiam e que se magoem no caso de desmaiarem.¹
- Os doentes devem evitar conduzir ou utilizar máquinas perigosas se sentirem tonturas ou sensação de desmaio.¹
- A associação de álcool com PRILIGY® pode aumentar a probabilidade de desmaios e potenciar os efeitos relacionados com o álcool. Os doentes deverão evitar o consumo de álcool enquanto estão em tratamento com PRILIGY®.¹
- Os doentes não devem utilizar substâncias ilícitas ou medicamentos para fins recreativos durante o tratamento com PRILIGY®, pois tal poderá estar associado a riscos graves e inesperados para a saúde do doente.¹

Pouco frequentemente pode ocorrer paragem sinusal, bradicardia sinusal e hipertensão arterial sistólica.

Referências:

1. Resumo das Características do Medicamento - PRILIGY® (cloridrato de dapoxetina).
Última actualização de Fevereiro de 2009.

PRILIGY® Não Deve Ser Utilizado Em Doentes Com as Seguintes Contra-indicações:¹

- Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes.¹
- Situações cardíacas patológicas significativas, tais como:¹
 - Insuficiência cardíaca (classe II-IV da Associação do Coração de Nova Iorque (NYHA)).¹
 - Anomalias de condução (bloqueio AV de segundo ou terceiro grau ou síndrome do nódulo sinusal) não tratadas com um pacemaker permanente.¹
 - Doença cardíaca isquémica significativa.¹
 - Doença valvular significativa.¹
- Tratamento concomitante com IMAO, tioridazina, ISRSs, IRSNs, ADTs, ou outros medicamentos/produtos à base de plantas com efeitos serotoninérgicos e inibidores potentes da CYP3A4.¹
- Compromisso hepático moderado a grave.¹

Os homens com sinais e sintomas subjacentes de depressão deverão ser avaliados antes do tratamento com PRILIGY® para excluir perturbações depressivas não diagnosticadas.¹

Para mais informações sobre PRILIGY® por favor contacte:

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso nº 69A – Queluz de Baixo
2734-503 Barcarena - Portugal
Telefone: 21 436 88 35 | Fax: 21 434 30 28

Consulte o Resumo das Características do Medicamento antes de prescrever PRILIGY®.



JANSSEN-CILAG

FARMACÉUTICA, Lda
Inovamos pela Saúde

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A
Queluz de Baixo | 2734-503 Barcarena

www.janssen-cilag.pt

Sociedade por quotas • Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras,
sob o n.º 10576 • Capital Social €2.693.508,64 • N.º Contribuinte 500 189 412